

# Вакцинация – эффективная мера профилактики полиомиелита!

Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н.

**Вакцинация проводится по схеме:  
3 мес. - 4.5 мес. - 6 мес.**

**Ревакцинация – в 18 мес., 20 мес.  
и в 6 лет.**

Три вакцинации и первая ревакцинация проводятся инактивированной вакциной, а последующие ревакцинации – живой.



Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиенического образования населения»  
Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты  
прав потребителей  
и благополучия человека  
г. Москва, 1-й Смоленский пер.,  
д. 9, стр. 1  
e-mail: [cgon@cgon.ru](mailto:cgon@cgon.ru);  
тел.: 8 (499) 241 86 28



# Полиомиелит



<http://cgon.rospotrebnadzor.ru/>

<http://cgon.rospotrebnadzor.ru/>

# Полиомиелит

опасное для жизни инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусами.


## Источник инфекции

больной полиомиелитом человек или носитель вируса.

## Путь передачи

преимущественно фекально – оральным, реже – воздушно-капельным.

Инкубационный период колеблется от 4 до 30 дней, чаще 6-21 дней.



Полиомиелит может проявляться по-разному: от бессимптомного носительства до тяжелых паралитических проявлений.

# Симптомы

Среди первых симптомов полиомиелита лихорадка, слабость, головная боль, тошнота и рвота, боли в конечностях.

В тяжелых случаях в процесс вовлекаются двигательные нервные клетки и наступают параличи.

## Наиболее подвержены заболеванию дети:

- не привитые против полиомиелита,
- получившие менее 3-х прививок против полиомиелита,
- привитые с нарушением сроков вакцинации.



# Осложнения

Ателектазы легких, пневмония, сердечная недостаточность, желудочно-кишечные расстройства, парез кишечника и мочевого пузыря.

Параличи имеют стойкий характер и сопровождаются атрофией мышц и ортопедическими осложнениями – остеопорозом, переломами, сколиозом, нестабильностью суставов.

**Больной может погибнуть от дыхательной недостаточности, вызванной параличом дыхательных мышц.**

